

LE BOURGEONOSCOPE

1

Sur cet arbre, les bourgeons sont **OPPOSÉS** (disposés par paires, l'un en face de l'autre) : je suis sur la bonne face



Taille : Le bourgeon est « **petit** » (moins de 5 mm) s'il rentre dans la plus petite encoche, il est « **moyen** » (moins de 1 cm) s'il rentre dans la plus grande encoche. Il est « **grand** » (plus de 1 cm) s'il dépasse.

2

Sur cette face :

Érable champêtre
Érable sycomore
Érable plane
Cornouiller mâle
Cornouiller sanguin
Frêne élevé
Sureau noir
Viorne obier

3

Les bourgeons latéraux peuvent être plaqués contre la tige ou s'en écarter : on dit qu'ils sont « **appliqués** » ou « **dressés** ».

4

La **couleur** des bourgeons est un indice supplémentaire

5

Cet arbre est un...

LE BOURGEONOSCOPE

1

Sur cet arbre, les bourgeons sont **ALTERNES** (disposés d'un côté puis de l'autre) : je suis sur la bonne face



Taille : Le bourgeon est « **petit** » (moins de 5 mm) s'il rentre dans la plus petite encoche, il est « **moyen** » (moins de 1 cm) s'il rentre dans la plus grande encoche. Il est « **grand** » (plus de 1 cm) s'il dépasse.

2

×

Sur cette face :

Aulne glutineux
Charme commun
Chêne pédonculé
Hêtre commun
Noisetier
Orme champêtre
Sorbier des oiseleurs
Peuplier tremble

3

Les bourgeons latéraux peuvent être plaqués contre la tige ou s'en écarter : on dit qu'ils sont « **appliqués** » ou « **dressés** ».

4

La **couleur** des bourgeons est un indice supplémentaire

5

Cet arbre est un...